

AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
 Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170
 Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160
 Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
 Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas
 01 (871) 750 56 65 con 6 líneas



BACTERICIDA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial: **BLISSFUL®**
 Ingrediente activo: Sulfato de Estreptomicina & Clorhidrato de Oxitetraciclina
 Grupo químico: Antibiótico del grupo de los aminoglucósidos (estreptomicina) y tetraciclinas (oxitetraciclina).
 Formulación: Polvo humectable
 Concentración: 15.0 % Sulfato de Estreptomicina
 Equivalente: 150 g IA/Kg
 Concentración: 1.50 % Clorhidrato de Oxitetraciclina
 Equivalente: 15 g IA/Kg
 Nombre químico: Sulfato de O-2-deoxi-2-metilamino- α -L-glucopiranosil-(1-2)-O-5-deoxi-3-C-formil- α -L-lixofuranosil-(1-4)-N1,N3-diamidino-D-estreptamina
 Nombre químico: Clorhidrato de (4S,4aR,5S,5aR, 6S,12aS)-4-dimetilamino-1,4, 4a,5,5a,6,11,12a-octahidro-3,5,6,10,12,12a-hexahidroxi-6-metil-1,11-dioxonaftacen-2-carboxamida

Registro

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Apariencia: Polvo humectable color blanco
 Solubilidad en agua: Oxitetraciclina: 1000 mg/L a 20°C
 Sulfato de estreptomicina: 100,000 mg/L a 20°C
 Presión de vapor: Oxitetraciclina: $1.29 * 10^{-19}$ mPa a 25°C
 Sulfato de estreptomicina: -

RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVOS	PLAGA NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO	DOSIS	INTERVALO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Berenjena Chile Jitomate Papa Tomate de cáscara	Mancha bacteriana <i>Xanthomonas campestris pv vesicatoria</i>	60-70 g / 100 L de agua	SL	Realizar tres aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días. Volumen de aplicación 300-400 L de agua.

FICHA TÉCNICA

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Abra con cuidado el empaque con la ayuda de unas tijeras, pese con la ayuda de una báscula o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad indicada de **BLISSFUL**® y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente. Utilizar la dosis recomendada en 348.8 L de agua para dar una buena cobertura al follaje.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso. No aplicar con velocidades de viento mayores a 15 Km/hr. No aplicar si existe una alta probabilidad de lluvia porque se corre el riesgo de que el producto sea lavado. No aplicar este producto cuando no exista humedad suficiente en el suelo, al fin de evitar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD

BLISSFUL® no es fitotóxico a los cultivos aquí mencionados en esta etiqueta, bajo las recomendaciones aquí indicadas.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda **BLISSFUL**® en mezcla de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

PENDIENTE DE DEFINIR