

**AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.**  
**Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170**  
**Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160**  
**Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila**  
**Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas**  
**01 (871) 750 56 65 con 6 líneas**



## FUNGICIDA

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial: CELESTE® 720 FW  
 Ingrediente activo: Clorotalonil  
 Grupo químico: Cloronitrilo  
 Formulación: Suspensión acuosa  
 Concentración: 54 % clorotalonil  
 Equivalente: 720 g IA/L a 20°C  
 Nombre químico: Tetracloroisofaltonitrilo  
 No. CAS: 1897-45-6  
  
 Registro COFEPRIS No. **RSCO-FUNG-0309-468-008-054**

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Apariencia: Líquido viscoso de color blanco gris  
 pH: 7.5 ± 0.50  
 Solubilidad en agua: 0.81 mg/L a 20°C  
 Presión de vapor: 0.076 mPa a 25°C

### RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVOS	ENFERMEDAD NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO	DOSIS L/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD	TOLERANCIA EPA (ppm)	OBSERVACIONES
Tomate (Jitomate)	<b>Tizón temprano</b> <i>Alternaria solani</i>	2.0 - 2.5	Sin Límite	5	Deberá aplicarse al detectarse los primeros síntomas de la enfermedad, con un interval semanal entre cada aplicación del producto. Aplicación al follaje.
Papa	<b>Tizón temprano</b> <i>Alternaria solani</i>		Sin Límite	0.1	
Plátano	<b>Sigatoka negra</b> <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	1.5 - 2.5	7	0.5	Realizar aplicaciones foliares a intervalos de 14 días; volumen de aspersión 600 L/ha.

### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de la aplicación verifique que el envase se encuentre en buen estado. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Agítelo antes de usar y proceda a abrirlo por la parte superior evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

Con el equipo de protección puesto, abra cuidadosamente el envase. En un tambo de 200 L agregue agua hasta la mitad de su capacidad. Vierta lentamente en el tambo la cantidad necesaria del producto, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, llene el tambo con el agua necesaria. Aplique de inmediato.

Cada vez que llene la aspersora, deberá agitar antes la mezcla preparada. Para obtener mejores resultados se recomienda utilizar el volumen necesario de agua. En aplicaciones terrestres de 200 a 400 L asegúrese de obtener una buena cobertura

Para obtener una mayor calidad en la aplicación de **CELESTE® 720 FW** (cobertura, dispersión, extensión y humectación), es recomendable el uso de un coadyuvante del tipo no iónico.

#### **CONTRAINDICACIONES**

No aplicar cuando amenace lluvia o esté presente, dado que la acción del producto depende de su presencia en la superficie del follaje. Esperar de 7 a 10 días después de haber realizado una aplicación con productos a base de aceite para aplicar **CELESTE® 720 FW**.

#### **FITOTOXICIDAD**

**CELESTE® 720 FW** no es fitotóxico a los cultivos indicados y bajo las dosis recomendadas:

#### **PRESENTACIONES DISPONIBLES**

Envase 1 L  
Envase 10 L  
Envase 50 L  
Envase 200 L