

**AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.**  
 Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170  
 Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160  
 Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila  
 Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas  
 01 (871) 750 56 65 con 6 líneas



**NEMATICIDA**

**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Nombre comercial: CHIMAL®  
 Ingrediente activo: *Paecilomyces lilacinus*  
 Grupo químico: Es un nematicida microbioal de origen biológico  
 Formulación: Polvo humectable  
 Concentración: 6.53 % *paecilomyces lilacinus*  
 Equivalente: 65.3 g IA/Kg  
 No. CAS: NA

Registro COFEPRIS No. **RSCO-NEMA-0907-307-002-007**

**PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

Apariencia: Polvo fino color lila  
 Clasificación: Biológico  
 Humedad: ≤ 5%

**RECOMENDACIÓN DE USO**

CULTIVOS	PLAGA NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO	DOSIS g/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Berenjena Chile Jitomate Papa Tabaco	<b>Nemátodo agallador</b> <i>Meloidogyne incognita</i>	250 - 500	0	Realizar tres aplicaciones en drench a la base del tallo de la planta, a intervalos de 5 días.
Crisantemo Girasol Gérbera Áster	<b>Nemátodo filiforme</b> <i>Pratylenchus neglectus</i>	250 - 500	SL	Realizar una aspersión en drench, tres días después del transplante; de ser el caso realizar dos aplicaciones adicionales a intervalos de cinco días; utilizando un volumen de aplicación 500 - 600 L/ha.
Papaya	<b>Nemátodo agallador</b> <i>Meloidogyne sp.</i>	200 - 600	SL	Realizar dos aplicaciones en drench a la base del tallo a intervalo de 14 días; utilizando un volumen de aplicación 10 mL de agua/planta.
Piña	<b>Nemátodo agallador</b> <i>Meloidogyne sp.</i>	400 - 600	SL	Realizar dos aplicaciones en drench, a la base de la planta, a intervalos de 14 días.

**FICHA TÉCNICA**

#### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Abra con cuidado el empaque con la ayuda de unas tijeras, pese la cantidad de **CHIMAL**® a utilizar con la ayuda de una báscula o de algún otro utensilio específico para este fin. Mezcle en un recipiente con agua la cantidad de producto a utilizar y de acuerdo a la dosis, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente.

#### CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso; cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea alta.

#### FITOTOXICIDAD

**CHIMAL**® no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, sí es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

#### PRESENTACIONES DISPONIBLES

Bolsa 250 g