

**AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.**  
**Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170**  
**Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160**  
**Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila**  
**Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas**  
**01 (871) 750 56 65 con 6 líneas**



## REGULADOR DE CRECIMIENTO

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial: DISTINGO®  
 Formulación: Polvo soluble  
 Composición garantizada: Ácido Giberélico (Ag<sub>3</sub>) 10.00%

Registro COFEPRIS No. **RSCO-013/I/10**

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Apariencia: Polvo fino de color blanco  
 Clasificación: Regulador de crecimiento  
 pH: 3.2

### RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVO	DOSIS g / 100 L de agua	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Alfalfa	20	Aplicar 10-15 días después de cada corte durante otoño e invierno.
Café	20	Aplicar 30 días antes de la cosecha.
Calabacita	15 - 25	10 días después de plantar y en plena floración.
Chile	25 - 45	10 días después de plantar y en plena floración.
Col	20	15 y 45 días después de transplantar.
Espinaca	30	Al tener plantas con 3 o 4 hjas y 7 días después.
Frijol. Soya y Chícharo	10	A principios de la floración.
Fresa	20	4 semanas después del transplante.
Cítricos	10	Un mes antes de la recolección o cosecha.
Melón, Pepino y Sandía	20	Aplicación al follaje al inicio de la floración.
	40	Aplicación al fruto 3 semanas antes de la cosecha.
Ornamentales	20	Durante el desarrollo vegetativo.
Jitomate	25 - 45	Desde la aparición de los ramilletes florales.
Uva sin semilla	20	Antes de la floración asperjando los racimos. Mejora la apertura del racimo y aumenta el tamaño de la fruta.

FICHA TÉCNICA

#### INSTRUCCIONES DE USO

**DISTINGO**® es un regulador de crecimiento vegetal en polvo que mejora las condiciones de los cultivos al producir elongamiento y multiplicación celular, acelera la floración y mejora la calidad de los frutos. **DISTINGO**® está elaborado a base de ácido giberélico, una hormona vegetal natural. Para obtener resultados óptimos, cuando se aplica **DISTINGO**®, se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar altas temperaturas mayores a 35°C.

#### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con la ayuda de unas tijeras abra el empaque, y mida en una báscula la cantidad de **DISTINGO**® necesaria, según la dosis indicada. Cloque la cantidad medida en un recipiente lleno a la mitad de su capacidad con agua limpia y agite, llene a su capacidad el recipiente y vuelva a agitar.

#### INCOMPATIBILIDAD

**DISTINGO**® sólo deberá mezclarse con productos registrados en cultivos autorizados. No se recomienda mezclar con productos de reacción alcalina como Caldo Bordelés, Polisulfuro de Calcio y productos de cobre.

#### PRESENTACIONES DISPONIBLES

Bolsa 10 g