

**AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.**  
**Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170**  
**Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160**  
**Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila**  
**Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas**  
**01 (871) 750 56 65 con 6 líneas**



**FUNGICIDA**

**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Nombre comercial: **LABRADOR®**  
 Ingrediente activo: *Trichoderma harzianum*  
 Grupo químico: Es un fungicida microbial de origen biológico  
 Formulación: Polvo humectable  
 Concentración: 1.40 % *trichoderma harzianum*  
 Equivalente: 14.0 g IA/Kg  
 No. CAS: 67892-31-3

Registro COFEPRIS No. **RSCO-FUNG-0301B-0194-002-1.4**

**PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

Apariencia: Polvo fino de color blanco.  
 Clasificación: Biológico  
 Humedad: ≤ 5%

**RECOMENDACIÓN DE USO**

CULTIVOS	PLAGA NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO	DOSIS g/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Calabacita Calabaza Pepino Melón Sandía	<b>Damping-Off / Marchitez</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	400 - 480	SL	Realizar dos aplicaciones en drench a la base de la planta, a intervalos de 21 días; utilizando un volumen de aplicación 30 mL / planta.
Jitomate Chile Tabaco Papa Berenejena	<b>Damping-Off / Marchitez</b> <i>Rhizoctonia solani, Phythium sp.</i>	480	SL	Realizar tres aplicaciones a la base de la planta a intervalos de 5 días entre cada aplicación; utilizando un volumen de aplicación 1000 L /ha.

**FICHA TÉCNICA**

### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Abra con cuidado el empaque con la ayuda de unas tijeras, pese la cantidad de **LABRADOR**® a utilizar con la ayuda de una báscula o de algún otro utensilio específico para este fin. Mezcle en un recipiente con agua la cantidad de producto a utilizar y de acuerdo a la dosis, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente.

No se recomienda aplicar con productos químicos, si requiere aplicar combinando agroquímicos mezcle éstos por separado y vierta en el tanque. Posteriormente agregue **LABRADOR**®.

### CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso; cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea alta.

### FITOTOXICIDAD

**LABRADOR**® es compatible con cipermetrina, clethodim, clorotalonil y fertilizantes foliares debidamente registrados en los cultivos autorizados. Sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

### PRESENTACIONES DISPONIBLES

Bolsa 400 g