

AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170
Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas
01 (871) 750 56 65 con 6 líneas

MONOCROTOFOS
600

INSECTICIDA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial: MONOCROTOFOS® 600
 Ingrediente activo: Monocrotofos
 Grupo químico: Organofosfato
 Formulación: Líquido miscible
 Concentración: 56 % monocrotofos
 Equivalente: 600 g IA/L a 20°C
 Nombre químico: Dimetil (E)-1-metil-2-(metil carbamoil) vinil fosfato
 No. CAS: 6923-22-4

Registro COFEPRIS No. **RSCO-INAC-0149-302-012-056**

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Apariencia: Líquido ámbar oscuro, cristalino libre de impurezas
 pH: 2.0 ± 1.0
 Solubilidad en agua: 818000 mg/L a 20°C
 Presión de vapor: 0.29 mPa a 25°C

RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVOS	PLAGAS NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO	DOSIS L/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD	TOLERANCIA (ppm)
Tabaco	Pulgón <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	0.75 - 1.25	5	EXENTO
	Gusano de cuerno del tabaco <i>Manduca sexta</i>	1.0 - 1.5		
	Gusano de cuerno de jitomate <i>Manduca quinquemaculata</i>			
	Gusano de la yema del tabaco <i>Helithis virescens</i>			
	Mosquita blanca <i>Bermisia tabaci</i>			

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de la aplicación de **MONOCROTOFOS® 600** verifique que el envase se encuentra en buen estado. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión ábralos con cautela. Agítelo antes de usar y proceda a abrirlo por la parte superior evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

Debe utilizarse cantidad suficiente de aspersion para cubrir perfectamente el cultivo.

Para aplicación terrestre NO emplear menos de 200 L de agua por hectárea.

Para aplicación con equipo aéreo, utilizar no menos de 25 L de agua por hectárea. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en los envases originales y guardarse bajo llave para uso posterior. Deben seguirse estrictamente las medidas de seguridad recomendadas en esta etiqueta.

FICHA TÉCNICA

CONTRAINDICACIONES

Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en las horas de calor intenso ni cuando el viento sea fuerte (más de 15 Km/h). No pastorear ganado en áreas tratadas.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a las dosis recomendadas en los cultivos aquí recomendados.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase 950 mL

Envase 5 L