

AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170
Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas
01 (871) 750 56 65 con 6 líneas


FUNGICIDA SISTÉMICO Y DE CONTACTO
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	NOSTER® CLN
Ingrediente activo:	Cymoxanil + Clorotalonil
Grupo químico:	Cymoxanil: Cianoacetamida oxima Clorotalonil: Cloronitrilo
Formulación:	Polvo humectable
Concentración:	8.00 % cymoxanil 72.00 % clorotalonil
Equivalente:	Cymoxanil: 80 g IA/Kg Clorotalonil: 720 g IA/Kg
Nombre químico:	Cymoxanil: 1-[(EZ)-2-ciano-2-metoxiiminoacetil]-3-etilurea Clorotalonil: Tetracloroisofaltonitrilo
No. CAS:	Cymoxanil: 57966-95-7 Clorotalonil: 1897-45-6
Registro COFEPRIS No.	RSCO-MEZC-1397-301-002-080

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Apariencia:	Polvo fino de color blanco a grisáceo
pH:	7.0 ± 1.5
Solubilidad en agua:	Cymoxanil: 780 mg/L a 20°C Clorotalonil: 0.81 mg/L a 20°C
Presión de vapor:	Cymoxanil: 0.15 mPa a 25°C Clorotalonil: 0.076 mPa a 25°C

RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVOS	ENFERMEDAD NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO	DOSIS Kg/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD	TOLERANCIA EPA (ppm)		OBSERVACIONES
				Cloro	Cymo	
Papa Tomate (Jitomate)	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	2.5 - 3.0	14	0.05 0.2	0.1 6.0	Inicie las aplicaciones de manera preventiva, si las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de la enfermedad, y repita a intervalos de 7 a 10 días o menos.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Abra el empaque con la ayuda de unas tijeras. Agregue la cantidad indicada de **NOSTER® CLN** en un volumen de agua suficiente para hacer una premezcla y después agregue el total de agua para la aspersión.

Utilice el volumen de agua necesario para que el follaje quede completamente cubierto (200 a 1000 L de agua por hectárea para equipo terrestre y 50 a 60 L por hectárea para equipo aéreo). Mantenga la mezcla en agitación continua. No utilice las manos para agitar la suspensión, aún cuando las proteja con los guantes.

CONTRAINDICACIONES

Es inestable en presencia de calor y/o humedad. No aplicar cuando la velocidad del viento sea superior a los Km/h.

FITOTOXICIDAD

NOSTER® CLN no es fitotóxico a los cultivos en las dosis aquí recomendadas.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Bolsa 1 Kg