

AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.

Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170
Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas
01 (871) 750 56 65 con 6 líneas



INSECTICIDA / ACARICIDA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial: PLATINO® 375 CE
 Ingrediente activo: Fenpropatrín
 Grupo químico: Piretroide
 Formulación: Concentrado emulsionable
 Concentración: 38.50 % fenpropatrín
 Equivalente: 375 g IA/L a 20°C
 Nombre químico: (RS)- α -ciano3-fenoxibencil-2,2,3,3-tetrametilciclopranocarboxilato
 No. CAS: 39515-41-8
 Registro COFEPRIS No. **RSCO-INAC-0193-318-009-039**

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Apariencia: Líquido de color amarillo, cristalino libre de impurezas
 pH: 5.2 ± 1.0
 Solubilidad en agua: 0.33 mg/L a 20°C
 Presión de vapor: 0.76 mPa a 25°C

RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVOS	PLAGAS NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO	DOSIS L/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD	TOLERANCIA (ppm)	OBSERVACIONES
Algodonero	Mosquita blanca <i>Bemisia sp</i>	0.4 - 0.6	4	1	Comenzar las aplicaciones cuando se presenten al menos 10 ninfas vivas en 10 hojas.
Tomate (Jitomate)	Mosquita blanca <i>Bemisia sp</i>	0.6	3	1	Iniciar las aplicaciones antes de que el cultivo empiece a florear y de que se presente la plaga.
Pepino Melón Sandía Calabaza Calabacita	Mosquita blanca <i>Bemisia tabaci</i> Pulgones <i>Aphis gossypii</i> Trips <i>Thrips tabaci</i> Minador de la hoja <i>Liriomyza munda</i>	0.4 - 0.5	7	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	Comenzar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros adultos. Se recomienda realizar dos aplicaciones a intervalo de 7 días.

FICHA TÉCNICA

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de la aplicación de **PLATINO® 375 CE** verifique que el envase se encuentra en buen estado. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión ábralos con cautela. Agítelo antes de usar y proceda a abrirlo por la parte superior evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Premezcle la cantidad requerida de **PLATINO® 375 CE** en un recipiente limpio y añada al tanque aspersor, manteniendo el agitador en movimiento durante el llenado. **PLATINO® 375 CE** está formulado como concentrado emulsionable, por lo que para su aplicación debe diluirse en la cantidad de agua necesaria para lograr un cubrimiento total y uniforme de las plantas, evitando escurrimientos. Con equipo de aplicación terrestre, se emplean de 200 a 400 L de agua/ha, y con la frecuencia necesaria de acuerdo con la curva de desarrollo de la plaga principal.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de viento y calor intenso.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico para los cultivos y a las dosis aquí recomendadas.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase 250 mL
Envase 975 mL