

AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
 Ventas línea urbana: (871) 713-71-30 / 717-15-87
 LADA SIN COSTO 01 (800) 00 83787
 Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160
 Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
 Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas



INSECTICIDA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial: ROKACH® 2E
 Ingrediente activo: Clorpirifos
 Grupo químico: Organofosfato
 Formulación: Concentrado emulsionable
 Concentración: 24.50 % clorpirifos
 Equivalente: 244 g de I.A. / L a 20°C
 Nombre químico: O,O- dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato
 No. CAS: 2921-88-2

Registro COFEPRIS No. **RSCO-URB-INAC-115-397-009-25**

ROKACH® 2E es un insecticida piretroide para el control de plagas de jardín. Por su granulometría homogénea se logra un control efectivo permitiendo realizar una aplicación y dosificación uniforme sin desperdicio del producto.

RECOMENDACIÓN DE USO

PLAGAS INTERIORES: ROKACH® 2E es activo en el control de cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, arañas, termitas, tijerillas, chapulines, pez plateado y otros insectos rastreros en edificios residenciales y comerciales incluyend casas, edificios de departamentos, comercios, bodegas y estructuras similares.

PLAGA NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO	DOSIS	MÉTODO DE APLICACIÓN
Cucaracha alemana <i>Blatella germanica</i> Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i> Cucaracha oriental <i>Blatella orientalis</i> Cucaracha australiana <i>Periplaneta australasiae</i> Cucaracha café ahumada <i>Periplaneta fuliginosa</i> Cucaracha de bandas café <i>Supella longipalpa</i> Cucaracha asiática <i>Blatella asahinai</i> Cucaracha café <i>Periplaneta brunnea</i>	AI 0.25% 11 mL / L de agua	Utilizar la concentración mas baja contra infestaciones leves de cucarachas y la alta para rápida reducción de infestaciones mayores.
Hormiga cabezazona <i>Pheidole megacephala</i> Hormiga de fuego <i>Solenopsis invicta</i> Hormiga segadora <i>Pogonomirmex spp</i> Hormiga arriera <i>Atta spp, Acromyrmex spp</i> Tijerilla <i>Forficula auricularia</i> Grillo <i>Acheta domestica</i>	AI 0.50% 22 mL / L de agua	

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, **AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.** no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

PLAGAS EXTERIORES: Superficies exteriores de construcción use **ROKACH® 2E** en dilución del 0.5% de Clorpirifos (22 mL/L) para el control de insectos rastreros como cucarachas, hormigas, garrapatas, pulgas, escarabajos, chapulines, arañas. Para efecto residual aplique por aspersión brocha en garajes, marcos y sitios donde se puedan congregan las plagas. Para impedir la entrada a las construcciones, tratar una banda de 2-3 m alrededor y de 60-90 cm de alto en la base de la misam. Utilice en este tipo de tratamiento, una mezcla de 20 mL en 10 L de agua, aplicando 400 mL de la mezcla/m².

PLAGAS EN CÉSPEDES Y ÁEAS ORNAMENTALES Y RECREACIONALES: Utilice **ROKACH® 2E** en el control de hormigas, garrapatas, pulgas, escarabajos, chapulines, arañas, siguiendo las instrucciones del siguiente cuadro de dilución.

PLAGA NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO	AREA A TRATAR m ²	PRODUCTO
Viuda negra <i>Latrodectus mactans</i>		
Araña café o violinista <i>Loxosceles reclusa</i>		
Alacrán <i>Centruroides spp.</i>		
Mosca doméstica <i>Musca domestica</i>		
Mosca de los establos <i>Stomoxys calcitrans</i>		
Mosca doméstica menor <i>Fannia canicularis</i>	100	48 mL
Falsa mosca de los establos <i>Muscina stabulans</i>	5000	2.4 L
Mosca negra <i>Ophyra spp.</i>	10000	4.8 L
Mosca de la carne o moscardón <i>Phaenicia spp</i>		
Chinche de cama <i>Cimex spp.</i>		
Pulgas <i>Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, Pulex sp</i>		
Garrapatas <i>Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, Ixodes escapularis, Dermacentor variabilis, Boophilus microplus</i>		
Gallina ciega <i>Phyllophaga sp</i> (adultos)	100 5000	128 mL 6.4 L

Las dosis deben ajustarse según la infestación y tipo de equipo.

TIEMPO DE REENTRADA: Para mayor seguridad del personal y de personas que vivan o laboren en el lugar, esperar 2-4 horas para ingresar en las áreas tratadas.

ROKACH® 2E es un insecticida organofosforado para el control de plagas de jardín. Por su granulometría homogénea se logra un control efectivo permitiendo realizar una aplicación y dosificación uniforme sin desperdicio del producto.

Las dosis deben ajustarse según la infestación y tipo de equipo.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Deberán inspeccionarse las áreas tratadas para aplicar cuando la reinfestación lo justifique.

CONTRAINDICACIONES

No perforo o incinere el envase.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase 250 mL
Envase 950 mL