

AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170
Planta formuladora: Alfonso Gómez Torres No. 160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas
01 (871) 750 56 65 con 6 líneas


FUNGICIDA
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial: TOKAT® 240 CE
 Ingrediente activo: Metalaxil
 Grupo químico: Fenilamida
 Formulación: Concentrado emulsionable
 Concentración: 25.30 % metalaxil
 Equivalente: 240 g IA/L a 20°C
 Nombre químico: Metil N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil) - DL- alaninato
 No. CAS: 57837-19-1

Registro COFEPRIS No. **RSCO-FUNG-0324-316-009-025**

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Apariencia: Líquido incoloro a ligeramente amarillo, cristalino, libre de impurezas
 pH: 6.0 ± 1.0
 Solubilidad en agua: 7100mg/L a 20°C
 Presión de vapor: 0.75 mPa a 25°C

RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVOS	ENFERMEDAD - NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO	DOSIS L/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD	TOLERANCIA EPA (ppm)	OBSERVACIONES
Chile	Marchitez ó Damping off <i>Fusarium sp,</i> <i>Phytophthora sp</i>	2 - 4	3	1	Realizar dos aplicaciones con intervalos de 28 días entre ellas. Las aplicaciones deben ser dirigidas a la base del cuello de las plantas.
Tomate (Jitomate)			7	1	
Papa			7	0.5	

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de la aplicación de **TOKAT® 240 CE** verifique que el envase se encuentra en buen estado.

Los recipientes sellados pueden desarrollar presión ábralos con cautela. Agítelo antes de usar y proceda a abrirlo por la parte superior evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando se presenten las condiciones óptimas para el desarrollo de la misma.

Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando se presenten las condiciones óptimas para el desarrollo de la misma. Si el producto se utiliza cuando la enfermedad se encuentra presente, es conveniente realizar el control lo antes posible, pues una severidad mayor al 20% implica reducciones importantes en el rendimiento y si las condiciones de desarrollo de la enfermedad son óptimas, es prácticamente imposible manejar la enfermedad cuando el índice de daño ha superado lo indicado anteriormente. En un tambo de 200 L agregue agua hasta la mitad de su capacidad.

Vierta lentamente en el tambo la cantidad necesaria de **TOKAT® 240 CE**, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, llene el tambo con el agua necesaria. Aplique de inmediato. Cada vez que llene la aspersora, deberá agitar antes la mezcla preparada. La aplicación de este producto se realiza en forma de aspersión dirigida a la base del cuello de la planta, posteriormente debe de realizarse un riego para promover que el producto sea incorporado a la zona radicular.

EQUIPOS DE APLICACIÓN TERRESTRE

Equipo terrestre de mochila o tractor, diluir en no menos de 200 L de agua/ha.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar más de 4 veces por temporada y alternar con fungicidas de contacto. Este producto no debe ser utilizado en aplicaciones foliares o en soluciones para bañar plantas. No permita la reentrada a las áreas tratadas hasta después de que la aspersión haya secado.

FITOTOXICIDAD

TOKAT 240 CE no es fitotóxico en las dosis y en los cultivos aquí recomendados.

PERSISTENCIA

Poco persistente.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase 250 mL
Envase 1 L
Envase 10 L